

ATENȚIE



AMBROZIA

Modul de răspândire

Ambrozia crește în grădini, în lanuri de grâu, floarea-soarelui, pe terenurile lăsate în paragină, de-a lungul căilor ferate, drumurilor, marginea iazurilor, de-a lungul râurilor, pădurilor, în apropierea dărâmăturilor, șantiierelor de construcții, dar și în curțile caselor și parcurile din toate localitățile.

Se înmulțește prin semințe, care sunt răspândite prin intermediul vântului și își păstrează calitățile germinative până la 40 de ani. Perioada de vegetație pentru ambrozie se încheie odată cu primele brume și înghețuri.

Simptomele alergiei la ambrozie

Polenul de ambrozie afectează copiii și adulții. Persoanele alergice pot suferi de:

- 1) **rinoconjunctivită**, manifestată prin strănut frecvent, mâncărime la nivelul nasului, al ochilor, nas înfundat, secreții nazale abundente, ochi roșii (hiperemie conjunctivală);
- 2) **accese de astm**, cu episoade de tuse, dificultate în respirație sau respirație șuierătoare;
- 3) Afectarea pielii de tip **urticarie** (mâncărime), eczemă etc.
- 4) **șoc anafilactic** - cea mai severă reacție alergică, cu debut brusc, neașteptat, tablou clinic deseori dramatic, care poate duce la deces, necesitând intervenție medicală urgentă.

În caz de agravare a stării de sănătate adresați-vă de urgență după asistență medicală. În cazul în care, în anii precedenți, ați avut din simptomele menționate (lunile iulie-septembrie), efectuați un consult alergologic înainte de începerea sezonului (luna iunie).



Cum combatem ambrozia?

Distrugeți ambrozia prin aplicarea metodelor:

1) mecanice,

- discuiți;

- grăpați;

- cosiți mecanic vetrele compacte cu ambrozie de pe aliniamentele căilor ferate, drumurilor și pe marginea parcelelor;

- prășiți buruiiana cu sapa, în perioada de vegetație;

- smulgeți manual plantele solitare din vecinătate;

- alte lucrări sau metode specifice, aplicate în perioada de vegetație a plantelor.

Tăiați cât mai scurt planta (de la suprafața solului), anual, de 4-5 ori în perioada de vegetație și preveniți formarea noilor inflorescențe până la eradicarea totală a buruienii.

2) chimice,

erbicidați, prin stropire în faza de 4-6 frunze a buruienii, cu respectarea normei de consum, a perioadei de aplicare, cu utilizarea produselor de uz fitosanitar omologate în acest scop și incluse în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților (http://www.pesticide.md/registrul-de-stat/). Efectuați lucrările de aplicare a erbicidelor în coordonare cu specialiștii direcțiilor raionale pentru agricultură și alimentație și/sau cu specialiștii subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, cu alți specialiști în domeniu.

Pentru protecția sănătății populației, solicităm întregii societăți să vă mobilizați pentru realizarea activităților de combatere a acestei plante alergene.